



**Programa de Promoción de la Salud
y Prevención de las Enfermedades**

Servicio al Cliente

Tel.: 809-221-9111 Ext. 4000 / 3925 / 3924
1-809-200-0083 desde el interior sin cargos
Email.: servicioalcliente@arsplansalud.org.do

Promoción y Prevención

Tel.: 809-685-6674 / 809-221-9111 Ext.: 3579



Cáncer de Cervix


Programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades

Definición:

Es un tipo de cáncer que se presenta en el cuello uterino (la parte inferior de la matriz que va del útero a la vagina). Las células que componen el cuello del útero pueden sufrir cambios y convertirse en células precursoras de cáncer, este cambio se llama displasia y se puede detectar por medio de una prueba de papanicolau.

INFORMESE!!!

- En el grupo de 30 a 44 años es la tercera causa de muerte.
- La tasa específica de mortalidad se incrementa a medida que aumenta la edad.
- Para pacientes entre 40 y 49 años, el riesgo de fallecer es 5 veces mayor que para otros grupos.
- El carcinoma invasor se presenta después de los 40 años.




Síntomas:

La mayor parte del tiempo el cáncer de cervix es asintomático, de ahí la importancia de la prueba de papanicolau, pero cuando aparecen síntomas el primero es: Secreción vaginal acuosa teñida de sangre. Posteriormente se presenta sangrado vaginal sin dolor, intermitente o el manchado exclusivamente postcoital o después de la higiene diaria, incremento en la cantidad y duración del flujo menstrual y finalmente la hemorragia se hace continua, aparece dolor abdominal, dolor de espalda, dolor de piernas, pérdida de peso, pérdida del apetito.



Factores de riesgos:

- Inicio temprano de las relaciones sexuales.
- Tener múltiples compañeros sexuales.
- Pareja sexual que participe en actividades sexuales de alto riesgo.
- Haber presentado enfermedades de transmisión sexual.
- Estrato socioeconómico bajo.
- Fumar
- Dieta baja en frutas y verduras
- Uso de anticonceptivos orales por más de 12 años.



Exámenes Complementarios:

Papanicolau: Es la prueba reina para detección de cáncer de cervix, también se llama citología, es una prueba sencilla sin dolor que consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino con un pequeño cepillo y una espátula con el fin de identificar en ellas cambios sospechosos de malignidad.

Se debe realizar de 10 a 20 días después del primer día de la menstruación, se debe evitar el uso de duchas vaginales, lubricantes espermicidas, cremas y tener relaciones sexuales dos días antes de la prueba.

Colposcopia Biopsia: Si en el papanicolau se encuentran células sospechosas de malignidad se hace una colposcopia que consiste en un examen de la vagina y el cervix con un instrumento luminoso de aumento semejante a un microscopio para identificar la zona exacta de donde proceden las células alteradas, una vez identificada la zona se toma una biopsia que es una muestra de tejido para llevarla al laboratorio y examinarlo en el microscopio.